

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению препарата КонтрСекс Neo® таблетки для котов и кобелей  
для регуляции половой охоты у котов и кобелей  
(организация-разработчик ООО «НВП «Астрафарм», 117246, г. Москва  
ул. Научный проезд, д. 20 стр.3)

**I. Общие сведения**

1. Торговое наименование: КонтрСекс Neo® таблетки для котов и кобелей (ContrSex Neo tabulettae pro cattorum et canum masculinum).

Международное непатентованное наименование: бутират мепрегенола и этинилэстрадиол.

2. Лекарственная форма: таблетки для перорального применения.

Лекарственный препарат КонтрСекс Neo® таблетки для котов и кобелей в качестве действующих веществ в 1 таблетке (100 мг) содержит: ацетобумедон (бутират мепрегенола) -0,500 мг и этинилэстрадиол – 0,020 мг; в качестве вспомогательных веществ: лактозу, крахмал картофельный, кальция стеарат, краситель Тропеолин О.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой таблетки овальные, светло-желтого или кремового цвета, с логотипом «Neo».

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 2 года со дня производства.

Срок годности лекарственного препарата, после первого вскрытия, не более 30 дней при условии хранения от 0 °C до 25 °C.

Лекарственный препарат КонтрСекс Neo® таблетки для котов и кобелей запрещается применять по истечении срока годности.

4. КонтрСекс Neo® таблетки для котов и кобелей выпускают расфасованным по 5 таблеток в стрипе или блистере. По 2 блистера или стрипа с лекарственным препаратом помещают в картонную пачку с инструкцией по применению.

5. Хранить лекарственный препарат следует в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °C до 25 °C.

6. Лекарственный препарат КонтрСекс Neo® таблетки для котов и кобелей следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: гормоны и их антагонисты.

КонтрСекс Neo® таблетки для котов и кобелей – гормональный лекарственный препарат, предназначенный для регуляции половой охоты у котов и кобелей.

Входящий в состав лекарственного препарата гестаген – ацетобумедон блокирует в гипоталамусе медиобазальные зоны, высвобождающие гонадолиберин который является пусковым механизмом секреции гипофизом фолликулостимулирующего (ФСГ) и люteinизирующего (ЛГ) гормонов, ответственных за секрецию тестостерона и сперматогенез. Эстроген – этинилэстрадиол в комплексе с ацетобумедоном усиливает успокаивающий эффект.

10. Фармакодинамика и фармакокинетика: ацетобумедон и этинилэстрадиол хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

КонтрСекс Neo® таблетки для котов и кобелей по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают отрицательного влияния на организм животных.

## III. Порядок применения

11. Лекарственный препарат КонтрСекс Neo® таблетки для котов и кобелей применяют для регуляции половой охоты и связанного с ней нежелательного поведения (агрессивности, мечения территории, повышенной возбудимости) у котов и кобелей.

12. Лекарственный препарат противопоказан животным, не достигшим половой зрелости, при заболеваниях половых органов, сахарном диабете, мочекаменной болезни и индивидуальной непереносимости компонентов.

13. Лекарственный препарат вводят перорально с кормом или принудительно на корень языка. Дозировка зависит от массы тела животного и цели применения (см. таблицу):

Таблица

Вид животного	Назначение ЛП	Масса тела животного, кг	Дозировка	Курс применения	Начало приема	Примечания
Коты	Регуляция половой охоты	Прекращение половой охоты	До 5 кг 5,1-10 кг	1 таблетка 1-2 таблетки	1 раз в день в течение 3-5 дней	При появлении первых признаков половой охоты
						1. Незэффективно применение лекарственного препарата, если с момента начала половой охоты прошло более 2-х дней. 2. Молодым котам в первый день курса назначают 2 таблетки, далее по схеме. 3. Наилучший эффект достигается, если после успокоения животного продлить курс применения препарата на один день. 4. В отдельных случаях применение лекарственного препарата продлевают до полного прекращения половой охоты.
Кобели	Регуляция половой охоты	Прекращение половой охоты	до 5 кг 5,1-10 кг 10,1-30 кг свыше 30 кг	1 таблетка 1-2 таблетки 2-4 таблетки 4+1 таблетка на каждые последующие 10 кг массы тела	1 раз в день в течение 5-7 дней	При появлении первых признаков половой охоты
						1. Незэффективно применение лекарственного препарата, если с момента начала половой охоты прошло более 2-х дней. 2. Молодым кобелям в первый день курса назначают двойную дозу единовременно, далее по схеме. 3. Наилучший эффект достигается, если после успокоения животного продлить курс применения препарата на один день. 4. В отдельных случаях применение лекарственного препарата продлевают до полного прекращения половой охоты.

Через 2 – 3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции организма.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

15. Особеностей действия лекарственного препарата КонтрСекс Neo® таблетки для котов и кобелей при первом применении или при отмене не установлено.

16. Запрещается применение лекарственного препарата КонтрСекс Neo® таблетки для котов и кобелей, животным, не достигшим половой зрелости.

17. Следует избегать пропусков очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

18. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата КонтрСекс Neo® таблетки для котов и кобелей в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается.

19. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами отсутствует.

20. Лекарственный препарат КонтрСекс Neo® таблетки для котов и кобелей не предназначен для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При работе с лекарственным препаратом КонтрСекс Neo® таблетки для котов и кобелей следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Пустую тару, из-под лекарственного препарата, запрещается применять для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом КонтрСекс Neo® таблетки для котов и кобелей.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименования и адреса производственных площадок производителей лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

1. ООО «НПК «СКиФФ», 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

2. ООО «НВП «Астрафарм», 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

ООО «НВП «Астрафарм» 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата КонтрСекс Neo таблетки для котов и кобелей, утвержденная Россельхознадзором 18 января 2012 года.

Номер регистрационного удостоверения

**77-3-11.15-2894 № ПВР-3-6.0/02597**