

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата КонтрСекс Нео капли для котов и кобелей

Общие сведения

Торговое наименование: КонтрСекс Нео капли для котов и кобелей (ContrSex Neo guttae ex catta et canis). Международное непатентованное наименование: ацетобумедон и этинилэстрадиол.

КонтрСекс Нео капли для котов и кобелей - лекарственный препарат в форме раствора для перорального применения. Лекарственный препарат в качестве действующих веществ содержит в 1мл: ацетобумедона – 5,0 мг/см³ и этинилэстрадиола – 0,2 мг/см³; а в качестве вспомогательного вещества: масло соевое. Выпускают КонтрСекс Нео капли для котов и кобелей расфасованными по 2,0; мл в полимерные флаконы-капельницы с крышкой контроля первого вскрытия.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года со дня изготовления. Датой изготовления лекарственного препарата считают дату расфасовки.

КонтрСекс Нео капли для котов и кобелей запрещается применять по истечении срока годности. КонтрСекс Нео капли для котов и кобелей хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°С до 25°С. КонтрСекс Нео капли для котов и кобелей следует хранить в местах, недоступных для детей. И использованные флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

Фармакологические свойства

КонтрСекс Нео капли для котов и кобелей – препарат, предназначенный для регуляции половой охоты у котов и кобелей. Входящий в состав лекарственного препарата гестаген – ацетобумедон – блокирует в гипоталамусе медиобазальные зоны, высвобождающие гонадолиберины (фолликулостимулирующий и лютеинизирующий релизинг гормоны), которые являются пусковым механизмом секреции гипофизом фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, ответственных за секрецию тестостерона и сперматогенез. Эстроген - этинилэстрадиол в комплексе с ацетобумедоном усиливает успокоительный эффект. Ацетобумедон и этинилэстрадиол быстро всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

КонтрСекс Нео капли для котов и кобелей по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ

12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают отрицательного влияния на организм животных.

Порядок применения

Лекарственный препарат КонтрСекс Нео капли для котов и кобелей применяют для регуляции половой охоты и связанного с ней нежелательного поведения (агрессивности, мечения территории, повышенной возбудимости и пр.) у котов и кобелей. Лекарственный препарат вводят перорально, капая в рот или на лакомство. Дозировка зависит от массы тела животного и цели применения (см. таблицу на обороте инструкции).

КонтрСекс Нео капли для котов и кобелей противопоказан животным, не достигшим половой зрелости, при новообразованиях половых органов, сахарном диабете, мочекаменной болезни и индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата. Не рекомендуется котам и кобелям давать лекарственный препарат, предназначенный для кошек и сук и, наоборот, вследствие различного гормонального фона мужских и женских особей.

Через 2-3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции животных.

Симптомы передозировки не описаны.

Побочных явлений и осложнений, а также привыкания к лекарственному препарату при применении КонтрСекс Нео капли для котов и кобелей в соответствии с настоящей Инструкцией не наблюдается. При индивидуальной непереносимости компонентов препарата применение его прекращают.

КонтрСекс Нео капли для котов и кобелей совместимы со всеми лекарственными препаратами.

Таблица 1

Вид животного	Назначение ЛП		Масса тела животного, кг	Дозировка	Курс применения	Начало приема	Примечания
Коты	Регуляция половой охоты	Прекращение половой охоты	До 5 кг	4 капли	1 раз в день в течение 3-5 дней	При появлении первых признаков половой охоты	1. Неэффективно применение лекарственного препарата, если с момента начала половой охоты прошло более 2-х дней. 2. Молодым котам в первый день курса назначают 2 таблетки, далее по схеме. 3. Наилучший эффект достигается, если после успокоения животного продлить курс применения препарата на один день. 4. В отдельных случаях применение лекарственного препарата продлевают до полного прекращения половой охоты.
			5,1-10 кг	4-8 капель			

		Поддержан ние успока ивающего эффекта	Незави симо от массы тела жи вотного	4 капли	Регулярно 1 раз в 10- 14 дней	В период по лового покоя	
Кобели	Регу ляция по лово й охоты	Прекраще ние поло вой охоты	до 5 кг 5,1-10 кг 10,1-30 кг свыше 30 кг	2 капли 2-4 капли 4-12 капель 12+2 кап ли на каждые последу ющие 5 кг массы тела	2 раза в день, с ин тервалом 12 ч в тече ние 5-7 дней	При появле нии первых признаков половой охо ты	1. Неэффективно приме нение лекарственного препа рата, если с момента начала половой охоты прошло бо лее 2-х дней. 2. Молодым кобелям в пер вый день курса назначают двойную дозу одновременно, далее по схеме. 3. Наилучший эффект до стигается, если после успо коения животного продлить курс применения препарата на один день. 4. В отдельных случаях при менение лекарственного препарата продлевают до полного прекращения поло вой охоты.

Меры личной профилактики

При работе с КонтрСекс Нео капли для котов и кобелей следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании применения следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки его следует тотчас смыть струей воды, при попадании внутрь – обратиться к врачу. Специфический антидот отсутствует. Лечение симптоматическое.

Инструкция разработана ООО «НВП «Астрафарм», г. Москва.
ООО «НВП «Астрафарм», г. Москва, Научный проезд, д.20
тел.: (495) 785-83-50