

Веракол:

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ВЕРАКОЛА

(Организация-производитель ООО «АлексАнн», Московская обл.)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Веракол — комплексное гомеопатическое лекарственное средство, содержащее в качестве действующих веществ гомеопатические компоненты *Podophyllum D8*; *Arsenicum album D10*; *Veratrum album D8*; *Colocynthis D8* и в качестве вспомогательных веществ натрия хлорид и воду для инъекций (инъекционный раствор) или сахарную крупку, кальция стеарат (таблетки).

2. Выпускают Веракол в форме стерильного раствора для инъекций, расфасованного по 10 и 100 мл в стеклянных флаконах соответствующей вместимости, герметично укупоренных и обкатанных алюминиевыми колпачками, а также в таблетках — по 50 таблеток в банках полимерных для лекарственных средств, закрытых полиэтиленовыми крышками или банках из оранжевого стекла соответствующей вместимости.

Хранят Веракол в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 0 °С до 25 °С.

Срок годности Веракола при соблюдении условий хранения — 3 года со дня изготовления (раствор для инъекций), 5 лет (таблетки). Запрещается использовать Веракол после окончания срока его годности.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

3. Веракол обладает противовоспалительным действием, регулирует моторику желудочно-кишечного тракта.

4. По степени воздействия на организм препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местнораздражающим и сенсibiliзирующим действием.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

5. Веракол назначают с лечебной целью животным всех возрастных групп при гастроэнтерите, энтеритной форме колибактериоза, гастрите, спастическом колите, панкреатите, рвоте, отравлении, диспепсии.

6. Веракол раствор для инъекций вводят подкожно или внутримышечно. В острых случаях — 1 – 3 раза в день до стабилизации состояния.

Продолжительность лечения 7 – 10 дней. При необходимости курс повторяют. Разовая доза препарата на одно животное составляет:

лошадям 10,0 – 15,0 мл

крупному рогатому скоту 5,0 – 10,0 мл

свиньям 2,5 – 5,0 мл

козам, овцам 2,0 – 2,5 мл

жеребят, телятам, поросятам 2,0 – 2,5 мл

собакам крупных и средних пород 2,0 – 4,0 мл

собакам мелких пород, кошкам, щенкам, котят 0,5 – 2,0 мл

хорькам и фреткам – 0,5 мл

грызунам 0,2 – 0,3 мл

7. Веракол в таблетках назначают внутрь при гастроэнтерите легкой и средней степени тяжести 2 раза в день, при тяжелом течении заболевания — 3 раза в день. Длительность курса лечения 5 – 7 дней. Разовая доза препарата на одно животное составляет:

собакам крупных пород 3 таблетки

собакам средних пород 2 таблетки

собакам мелких пород, кошкам, щенкам, котят 1 таблетка

хорькам и фреткам $\frac{1}{2}$ – 1 таблетка

грызунам $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ таблетки

8. Веракол не вызывает побочного действия и осложнений при применении в соответствии с настоящей инструкцией.

9. Применение Веракола не исключает использования других лекарственных средств.

10. Продукция животноводства во время и после применения Веракола используется без ограничений. Компоненты, входящие в состав препарата в сверхмалых дозах, в организме животного не накапливаются.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

11. При работе с Вераколом следует соблюдать общие правила безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

12. Запрещается использовать флаконы из-под Веракола для пищевых целей.