Хондартрон

Инструкция по применению гомеопатического препарата Хондартрон для собак и кошек при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

(Организация-разработчик: ООО «АлексАнн», Московская область)

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Хондартрон (Chondartron®).

Международное непатентованное наименование: Rhododendron, Rhus toxicodendron, Ledum palustre, Symphytum, Apis mellifica, Causticum Hahnemanni, Calcium fluoratum, Lithium carbonicum, Sulfur, Comarum palustre.

Лекарственная форма: раствор для инъекций и раствор для перорального применения (капли).

В качестве действующих веществ **Хондартрон для инъекций** содержит матричные настойки растительного, органического происхождения и минеральные компоненты (в 1000 мл): Rhododendron Ø=D1 20 мкл; Rhus toxicodendron Ø 4 мкл; Ledum palustre Ø=D1 0,2 мкл; Symphytum Ø 9 мкл; Apis mellifica Ø=D1 1 нл; Causticum Hahnemanni D4 1 мг; Calcium fluoratum D4 1 мкг; Lithium carbonicum D4 1 мкг; Sulfur Ø=D4 0,1 мл; Comarum palustre Ø 40 нл и вспомогательные вещества: метил парагидроксибензоат - 0,5 г, натрия хлорид - 5,8 г, натрия ацетата три гидрат - 2,0 г, кислоту соляную до pH 5,4, спирт этиловый 95% - 5,26 г, воду для инъекций до 1000 мл.

Хондартрон раствор для перорального применения содержит матричные настойки растительного, органического происхождения и минеральные компоненты (в 1000 мл): *Rhododendron* Ø=D1 0,2 мл; *Rhus toxicodendron* Ø 40 мкл; *Ledum palustre* Ø=D1 2 мкл; *Symphytum* Ø 90 мкл; *Apis mellifica* Ø=D1 10 нл; *Causticum Hahnemanni* D4 10 мг; *Calcium fluoratum* D4 10 мкг; *Lithium carbonicum* Ø=D2 0,1 мкл; *Sulfur* Ø=D4 1 мл; *Comarum palustre* Ø 0,4 мкл и вспомогательные вещества: спирт этиловый 96% - 93,8 мл, воду очищенную - до 1000 мл.

По внешнему виду препараты представляют собой бесцветную прозрачную жидкость.

Выпускают Хондартрон для инъекций расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные флаконы, закупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками. Флаконы по 10 мл поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению. Хондартрон раствор для перорального применения выпускают расфасованными по 20 мл в полимерные флаконы с винтовой горловиной соответствующей вместимости, комплектуемые навинчиваемой крышкой с контролем первого вскрытия и пробкой-капельницей. Флаконы упаковывают поштучно в индивидуальные картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

Хондартрон хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 25°C.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя в закрытой упаковке - 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона - 30 суток. Запрещается применять по истечении срока годности.

Следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

Хондартрон относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам. Обладает противовоспалительным, обезболивающим, хондропротективным и регенерирующим действием при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у собак и кошек.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.00776), не обладает местно-раздражающим и сенсibiliзирующим действием.

III. Порядок применения

Хондартрон назначают собакам и кошкам для профилактики и лечения при:

- острых заболеваниях суставов и околоуставных структур (артрит, бурсит, синовит и пр.)
- заболеваниях и травмах сухожильно-связочного аппарата (тендинит, тендовагнит, растяжения, частичные разрывы сухожилий и пр.)
- остеоартритах, в том числе являющихся следствием различных остеохондропатий
- артрозах
- восстановлении после операционного вмешательства на суставах и сухожильно-связочном аппарате

Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

Хондартрон инъекции применяют внутримышечно или подкожно 2-3 раза в день в течение 10-14 дней:

- собакам и кошкам: 0,1 мл на 1 кг веса животного (мин. 0,5 мл, макс. 4,0 мл);
- лошадям 8,0-10,0 мл;
- крупному рогатому скоту 5,0 мл;
- телятам 2,5-3,0 мл;
- овцам, козам 3,0 мл.

Хондартрон капли вводят перорально в дозе 0,3 мл/10 кг массы животного два раза в день в течение 2-4 недель.

Симптомы передозировки у животных не установлены.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической и профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

При применении Хондартрона в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности и проявлении аллергических реакций, использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

Применение Хондартрона не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

Хондартрон не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

При работе с Хондартроном следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Хондартрона следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Организация-производитель: ООО «АлексАнн», 147000, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13.

Место производства: 147000, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13.

Дополнительная информация:

Схема применения Хондартрона собакам и кошкам:

Показания	Инъекции п/к или в/м	Раствор для перорального применения
Острые заболевания (артрит, бурсит, тендовагинит) и травмы (растяжения сухожилий и др.)	2-3 раза в день в течение 10-14 дней	2-3 раза в день в течение 10-14 дней
Хронические и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата	1-3 раза в неделю, курс 3-4 недели	Курс 3-4 недели, ежедневно
Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата у молодых животных	1 раз в день, курс от 3-4 недель до 2-3 месяцев	1 раз в день, курс от 3-4 недель до 2-3 месяцев
Профилактика обострений хронических заболеваний суставов	1-2 раза в день в течение 2-4 недель. Курс повторяют 2-3 раза в год.	1-2 раза в день в течение 2-4 недель. Курс повторяют 2-3 раза в год.