

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора



Н.А. ВЛАСОВ  
27.12.2018

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Флексиэктив®

(Организация-разработчик: ООО «ВИК – здоровье животных»,  
Россия, 140050, Московская область, г.о. Люберцы,  
дачный поселок Красково, Егорьевское шоссе, д. 3А, офис 34)

Номер регистрационного удостоверения: *32-3-32.13-4365 НТВН-3-4.15/02551*

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Флексиэктив® (Flexiactiv).

Международное непатентованное наименование: не присвоено.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Флексиэктив® выпускается в двух дозировках – массой 0,5 г и 1 г.

- таблетка массой 0,5 г в качестве действующих веществ содержит: глюкозамина сульфат – 250 мг, метилсульфонилметан – 125 мг, кальция аскорбат – 50 мг, марганца цитрат – 5 мг и экстракт ивы – 25 мг, в качестве вспомогательных веществ - кальция стеарат, ароматизатор «печень», полипласдон и поливинилпирролидон;

- таблетка массой 1 г в качестве действующих веществ содержит: глюкозамина сульфат – 500 мг, метилсульфонилметан – 250 мг, кальция аскорбат – 100 мг, марганца цитрат – 10 мг и экстракт ивы – 50 мг, в качестве вспомогательных веществ - кальция стеарат, ароматизатор «печень», полипласдон и поливинилпирролидон.

3. Флексиэктив® по внешнему виду представляет собой плоские таблетки с риской, бежевого цвета с более темными вкраплениями.

Срок годности таблеток Флексиэктив® в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения – 2,5 года со дня производства.

Запрещается применять Флексиэктив® по истечении срока годности.

4. Флексиэктив® выпускают расфасованным по 30, 60, 90 и 120 таблеток в банки полимерные соответствующей вместимости, укупоренные крышками с контролем первого вскрытия. Каждая потребительская упаковка препарата сопровождается инструкцией по применению.

5. Флексиэктив® хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при

температуре от 0 °С до 25 °С и относительной влажности не выше 60%.

6. Флексивэкс<sup>®</sup> следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Флексивэкс<sup>®</sup> – комбинированный лекарственный препарат, обладающий противовоспалительным и хондропротекторным действием.

10. Глюкозамин, являясь аминсахаридом, восполняет естественный дефицит глюкозамина, стимулирует синтез протеогликанов и гиалуроновой кислоты синовиальной жидкости; увеличивает проницаемость суставной капсулы, восстанавливает ферментативные процессы в клетках синовиальной мембраны и суставного хряща, обеспечивая его прочность. Способствует фиксации серы в процессе синтеза хондроитинсерной кислоты, облегчает нормальное отложение кальция в костной ткани, тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию и уменьшает боли.

Метилсульфонилметан – источник биодоступной серы, необходимой для синтеза соединительной ткани, в том числе основного белка соединительной ткани – коллагена.

Кальция аскорбат играет важную роль в образовании коллагена, являясь источником биогенного Са, необходимого для поддержания функционального состояния опорно-двигательного аппарата.

Марганца цитрат принимает активное участие в углеводном и липидном обмене, в процессах остеогенеза, нормализует рост. Марганец участвует в усвоении сульфата хондроитина – физиологического компонента тканей хряща. Введение дополнительного количества цитратов существенно снижает воспалительный процесс в капсуле сустава.

Экстракт ивы обладает противовоспалительным, обезболивающим, жаропонижающим и успокаивающим действием; препятствует тромбообразованию и, как слабая горечь, мягко стимулирует пищеварение.

Флексивэкс<sup>®</sup> по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. Флексивэкс<sup>®</sup> применяют:

- для лечения острых и хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата у собак, включая артрит, артроз, остеоартрит, остеоартроз, остеохондроз, остеохондропатию, остеопороз, дисплазию суставов;

- для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата у собак старше 6 лет; при повышенных нагрузках на выставках, соревнованиях, охоте; перед и после операций на опорно-двигательном аппарате; после лечения фторхинолонами.

12. Противопоказанием к применению таблеток Флексивэкс<sup>®</sup> является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. При работе с таблетками Флексивэкс<sup>®</sup> следует соблюдать общие правила

личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки с мылом.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с таблетками Флексивэкстив®.

Пустую тару из-под таблеток Флексивэкстив® запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте препарата со слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

14. Запрещается применение таблеток Флексивэкстив® животным в период беременности и лактации.

15. Флексивэкстив® применяют один раз в сутки принудительно на корень языка, или в кусочке лакомства (сыр, колбаса, мясо) или, измельчив, в смеси с суточной порцией корма, в следующих дозах:

Масса животного	Таблетка массой 1 г		Таблетка массой 0,5 г	
	для лечения (таблеток)	для профилактики (таблеток)	для лечения (таблеток)	для профилактики (таблеток)
до 5 кг	1/2	1/4	1	1/2
от 5 до 15 кг	1	1/2	2	1
от 15 до 30 кг	2	1	4	2
более 30 кг	3	2	6	4

Курс лечения от 30 до 90 суток в зависимости от тяжести заболевания. После 30 дней приема, в случае улучшения, возможен переход на половинную дозу.

Для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата у собак старше 6 лет таблетки Флексивэкстив® применяют весной и осенью курсами по 30 суток.

При повышенных физических нагрузках Флексивэкстив® применяют в профилактической дозе. Применение препарата начинают за 20-30 суток до начала предполагаемой физической нагрузки, продолжают в период физической нагрузки и в течение 15 суток после ее окончания.

После операций на опорно-двигательном аппарате Флексивэкстив® применяют в профилактической дозе в течение 30-60 суток в зависимости от состояния животного.

После лечения фторхинолонами Флексивэкстив® применяют в профилактической дозе в течение 30 суток.

В случае острого заболевания, сопровождающегося сильной болью, Флексивэкстив® целесообразно первые 3-5 дней применять одновременно с нестероидными противовоспалительными средствами.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата использование таблеток Флексивэкстив® прекращают.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, отказ от корма, расстройство желудочно-кишечного тракта.

18. Не допускается совместное применение таблеток Флексивэкстив® с препаратами группы тетрациклина вследствие усиления всасывания антибиотика из желудочно-кишечного тракта, а также совместное применение с хлорамфениколом и пенициллинсодержащими препаратами из-за снижения их эффективности.

При совместном применении таблеток Флексивэкстив® с нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС) усиливается противовоспалительный и обезболивающий эффект последних.

19. Особенности действия при первом применении и при отмене лекарственного препарата не выявлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Флексивэкстив® не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

Иностранное унитарное предприятие «ВИК – здоровье животных», Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, д. 29 (полный производственный цикл)

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «ВИК – здоровье животных», Россия, 140050, Московская область, г.о. Люберцы, дачный поселок Красково, Егорьевское шоссе, д. 3А, офис 34

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению таблеток Флексивэкстив®, согласованная Россельхознадзором 02 сентября 2016 года.